

## 肺癌風險因子及建議檢測週期

風險分類	風險因子	建議尿液檢測週期
超危險群	<ol style="list-style-type: none"> <li>曾經罹患肺癌者。</li> <li>具有高危險群風險因子且曾經罹患肺部疾病(肺結核、肺氣腫及長期肺部發炎)者。</li> </ol>	<p>可更密集地進行本檢測做追蹤 每2-3個月一次 *建議至少搭配LDCT檢查1次</p>
高危險群	<ol style="list-style-type: none"> <li>年齡介於45-74歲，抽菸史超過30包年，仍在抽菸或戒菸尚未超過15年者。 *包年=每天抽菸__包x抽__年。</li> <li>年齡45歲以上，二等親內有肺癌家族史。</li> <li>煮食時未使用抽油煙機或每天烹飪總時數≥4小時，烹飪年數≥20年者。</li> </ol>	<p>每年4次 *建議至少搭配LDCT檢查1次</p>
中危險群	<ol style="list-style-type: none"> <li>長期暴露在二手或三手菸害環境者。</li> <li>長期暴露在粉塵、油煙、化學物質、放射、室外空汙嚴重環境工作者。</li> <li>居住地長期有懸浮粒子PM2.5及工廠廢氣汙染者。</li> <li>每天烹飪總時數≥2小時，烹飪年數≥10年者。</li> </ol>	<p>每年2次 *建議至少搭配LDCT檢查1次</p>
低危險群	<ol style="list-style-type: none"> <li>具疾病自覺意識者。</li> <li>偶爾暴露在二手或三手菸害環境者。</li> <li>短期暴露在粉塵、油煙、化學物質、放射、室外空汙嚴重環境工作者。</li> <li>居住地偶有懸浮粒子PM2.5及工廠廢氣汙染者。</li> <li>每天烹飪總時數≥2小時，烹飪年數&lt;10年。</li> </ol>	<p>每年1次</p>

內容僅供參考，任何檢測建議與醫療行為皆須諮詢醫師並進行評估。